



## Tetanus

Tetanus is een sporenvormend bacil. De sporen komen wijdverbreid voor in mest, grond en straatvuil, welke een ernstige complicatie vormt van penetrerende verwondingen.

Tetanus kan een werkgebonden oorzaak hebben (besmetting via werk, verminderde weerstand door het werk).

### Risico-groepen:

- Personen met diepe, uitgebreide en verontreinigde wonden, ook 2e + 3e graads brandwonden.
- Intraveneuze druggebruikers
- Personen met een beroep met verhoogde kans op verwondingen en contact met tetanus-sporen, zoals vuilnisophaalmedewerkers, grondarbeiders, hoveniers, veetelers, land/tuinbouwers, veld sporten, veterinaire artsen en mensen die veel met paarden werken.

Het tetanusvaccin bevat Thiomersal (conserveringsmiddel). Hierdoor is terughoudendheid bij het gebruik bij zwangere vrouwen geboden.

Het gecombineerde vaccin DTP (difterie, tetanus, kinkhoest(=Pertussus) bevat geen Thiomersal en heeft tevens als voordeel dat dit gecombineerde vaccin een boostereffect heeft.

### Symptomen van Tetanus:

Stijfheid aan spieren voorafgaand aan spierspasmen. Ademhalingspasmen en longontsteking zijn de gevaarlijkste symptomen alsmede schade aan het autonome zenuwstelsel welke cardiovasculaire problemen kan veroorzaken en wervelfracturen kunnen optreden door de spierspasmen.

### Meer informatie

Indien u meer informatie wenst, neemt dan contact op met Mw. L. Abell.

Griep Vaccinatie Service | Rotterdamse Rijweg 74 | 3043 BN Rotterdam | Telefoon 010 - 437 44 57  
Email [info@griepvaccinatie.nl](mailto:info@griepvaccinatie.nl) | [www.griepvaccinatie.nl](http://www.griepvaccinatie.nl)